

Néhány gondolat a *Poecilotheria* Simon, 1885 genuszról általánosságban, a genusz fajairól, azok tartásáról és viselkedésükről
írta Antal Marcel



→ *Bevezető*

Fő érdeklődésemet a terrarisztikában eme ázsiai genusz gyönyörű képviselői keltették fel. Köszönhető ez az egyedi és érdekes mintázatnak, a *Theraphosidae* viszonylatban is nagynak számító méreteknek, viselkedésüknek és nem utolsó sorban, mert még manapság is ritkaságnak számítanak. Köszönhető ez talán a “rossz” hírüknek, valamint annak, hogy szaporításuk nem könnyű. Elfogult kijelentés, de minden madárpókos állományát felékesíti egy-egy *Poecilotheria* faj.

Bár egyesek tartózkodnak tőlük a viselkedésük miatt, és a nem éppenséggel gyenge mérgeükről hírhedt *Poecilotheria* fajoktól, manapság mégis egyre több terráriumba vezet az útjuk, egyre többen “specializálódnak” ezekre az érdekes madárpókokra.

A *Poecilotheria* genusz esetén egy nagyra megnövő, Indiában és Sri Lankán honos, fánélő fajcsoportról van szó, melyet egy **Simon** nevű kutató írt le 1885-ben (Aranea: Theraphosidae: Poecilotheriinae).

A World Spider Catalog¹ *Poecilotheria* genusza jelenleg 14 fajt tart számon, melyekből egyes fajok viszonylag könnyen beszerezhetőek, más fajok viszont annál nehezebben. *P. uniformis* Strand, 1903 példának okáért, a kereskedelemben elérhetetlen, mindössze egy alkoholban tárolt hím alapján lett leírva ez a faj. Négy régebben, esetleg tévesen használt fajnevet szinonimizáltak ma hivatalos fajnévvel, ezek:

P. bara Chamberlin, 1917 = *P. subfusca* Pocock, 1895;
P. gadgili (Tikader, 1977) = *P. regalis* Pocock, 1899;
P. pococki Charpentier, 1996 = *P. smithi* Kirk, 1996;
P. vittata Pocock, 1895 = *P. striata* Pocock, 1895.

Valamint *P. hanumavilasumica* megegyezik *P. "hillyardi"* és *P. "kirki"* néven ismert fajokkal, melyet **Smith** írt le 2004-ben.

Egy mai napig még hivatalosan nem leírt faj is kapható a kereskedelemben, ennek a fajnak jelenleg a *Poecilotheria* sp. “*Tigris*” fantázianevevet adták, de már folynak a munkálatok és nagy valószínűséggel a *P. wesselstigrina* nevet fogja kapni.

A jelenleg leírt fajoknak nem ismertek alfajai, maximum színváltozatai, mint pl. a fekete *P. metallica*, vagy *P. ornata* “*Blue*”, melynek lábai kékesen irizálnak, bár tapasztalatom szerint, adott megvilágítás mellett minden *Poecilotheria* fajnak van egy kékes-lilás, ill. rózsaszín irizálása a lábakon, valamint a peltidiumon.

Sajnos vannak olyan emberek, akik azzal csinálnak üzletet, hogy jobb híjján két különböző fajt pároztatnak, aminek “köszönhetően” hibridek is vannak a piacon, ilyenek: *P. ornata* x *P. fasciata*, *P. regalis* x *P. fasciata*, *P. regalis* x *P. ornata* és *P. regalis* x *P. striata*.

¹ The World Spider Catalog, Version 6.5 by Norman I. Platnick

→ Általános információk

A *Poecilotheria* genusz fajai megtalálhatóak Indiában (*P. formosa*, *P. hanumavilasumica*, *P. metallica*, *P. miranda*, *P. regalis*, *P. rufilata* és *P. striata*) és Sri Lankán (*P. fasciata*, *P. ornata*, *P. pedersenii*, *P. smithi*, *P. subfusca* és *P. uniformis*). A térképen a piros jelzéssel ellátott helyeken található rá a különböző fajokra.

→ Időjárás, klíma, adatok


Fajnév	Hőmérséklet nappal	Hőmérséklet éjszaka	Páratartalom
<i>Poecilotheria fasciata</i>	27-30 °C	23-25 °C	70-80%
<i>Poecilotheria formosa</i>	26-28 °C	20-22 °C	70-80%
<i>Poecilotheria hanumavilasumica</i>	27-29 °C	22-24 °C	60-70%
<i>Poecilotheria metallica</i>	27-29 °C	20-22 °C	70-80%
<i>Poecilotheria miranda</i>	26-28 °C	20-22 °C	70-80%
<i>Poecilotheria ornata</i>	24-26 °C	20-22 °C	65-75%
<i>Poecilotheria pedersenii</i>	27-29 °C	22-24 °C	70-80%
<i>Poecilotheria regalis</i>	27-30 °C	22-24 °C	70-80%
<i>Poecilotheria rufilata</i>	26-28 °C	22 °C	80-90%
<i>Poecilotheria smithi</i>	20-22 °C	18 °C	80-90%
<i>Poecilotheria striata</i>	27-29 °C	22-24 °C	70-80%
<i>Poecilotheria subfusca</i>	20 °C	15-18 °C	80-90%
<i>Poecilotheria uniformis</i>	-	-	-
<i>Poecilotheria sp. "Tigris"</i>	27-29 °C	20-22 °C	70-80%

→ Terráriumi tartás általánosságban

→ Szexálás és szaporítás általánosságban

→ A *Poecilotheria* genusz fajairól

A *Poecilotheria* fajok megkülönböztetésére van egy viszonylag könnyű módszer, ez az ún. lábmintázat (leg pattern) megállapítása, amit ventrális nézetben láthatunk. Ezt a módszert Martin Huber és Søren Rafn ábrázolta először.




Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria fasciata (Latreille, 1804)



Adult nőstény



mf *fasciata* (Latreille, 1804) *.....Sri Lanka

Mygale f. Latreille, 1804a: 160 (D).

Mygale f. Latreille, 1806: 83 (D).

Mygale f. Hahn, 1835: 65, f. 157 (Df).

Mygale f. C. L. Koch, 1841a: 41, f. 717 (f).

Scurria f. C. L. Koch, 1850: 74.

P. f. Simon, 1885e: 38.


P. f. Karsch, 1891: 274 (Dm).

P. f. Pocock, 1899a: 87, pl. 7, f. 2 (f).

Scurria f. Pocock, 1900a: 192.

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria formosa Pocock, 1899



- f *formosa* Pocock, 1899.....India
- P. f.* Pocock, 1899a: 91 (Df).
- P. f.* Schmidt, 1995j: 5, unnumbered f. (f).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria hanumavilasumica Smith, 2004



mf *hanumavilasumica* Smith, 2004.....India
P. h. Smith, 2004: 52, f. 1-17 (Dmf).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria metallica Pocock, 1899



f *metallica* Pocock, 1899.....India

P. m. Pocock, 1899a: 93, pl. 7, f. 3 (*Df*).

P. m. Pocock, 1900c: 129, pl. 12, f. 3 (*f*).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria miranda Pocock, 1900




P. miranda Pocock, 1900.....India
P. m. Pocock, 1900a: 190 (Df).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria ornata Pocock, 1899



Adult nőstény és hím



P. ornata Pocock, 1899.....Sri Lanka

P. o. Pocock, 1899a: 93 (Df).

P. o. Peters, 2000b: 83, f. 234 (f).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria pederseni Kirk, 2001



mf pederseni Kirk, 2001.....Sri Lanka
P. p. Kirk, 2001: 77, f. 1-4, 9-22 (Dmf).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria pococki Charpentier, 1996

mf **pococki** Charpentier, 1996.....Sri Lanka
P. p. Charpentier, 1996c: 23, f. 1-19 (Dmf).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria regalis Pocock, 1899



Adult nőstény és hím



mf *regalis* Pocock, 1899.....India

P. r. Pocock, 1899a: 89, pl. 7, f. 1 (Dmf).

P. r. Pocock, 1900c: 127, pl. 12, f. 1 (mf).

Ornithoctonus gadgili Tikader, 1977e: 308, f. 11-15 (Df).

P. r. von Wirth, 1991a: 5, f. 1-2 (f, S).

P. r. Schmidt, 1993d: 130, f. 412-413 (f).

P. r. Peters, 2000b: 84, f. 238 (f).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria rufilata Pocock, 1899



- mf *rufilata* Pocock, 1899.....India
- P. r.* Pocock, 1899d: 746 (Dm).
- P. r.* Pocock, 1900a: 189 (Df).
- P. r.* Charpentier, 1996a: 16, f. 1a-g, 2a-k (mf).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria smithi Kirk, 1996



mf *smithi* Kirk, 1996.....Sri Lanka

P. s. Kirk, 1996: 24, f. 1-14 (Dmf).

P. s. Peters, 2000b: 86, f. 245-246 (mf).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria striata Pocock, 1895



mf *striata* Pocock, 1895.....India

P. s. Pocock, 1895a: 172 (Df).

P. vittata Pocock, 1895a: 172 (Dm).

P. s. Kirk, 1996: 22 (Sm).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria subfusca Pocock, 1895



- mf *subfusca* Pocock, 1895.....Sri Lanka
Scurria fasciata Ausserer, 1871a: 199, pl. 1, f. 8 (m, misidentified).
P. s. Pocock, 1895a: 171 (Dmf).
P. bara Chamberlin, 1917: 71 (Df).
P. s. Kirk, 1996: 21 (S).

Genus *Poecilotheria* Simon, 1885

Poecilotheria uniformis Strand, 1913

m *uniformis* Strand, 1913.....Sri Lanka
P. u. Strand, 1913d: 115 (Dm).